


はしもと小児科

〒954-0112 見附市上新田町 449-7

TEL 0258-61-2400, 予約専用 61-2401, FAX 61-2402

<http://www.mynet.ne.jp/hasimoto/>

院長 橋本尚士:新潟大学医学博士,日本小児科学会認定小児科専門医,日本アレルギー学会認定アレルギー専門医



薬の飲ませ方

乳児

水ぐすりはそのまま、粉ぐすりは少量の湯ざましで、だんご状にして上あごにこすりつけ、その後、水、湯ざまし、ミルクなどを与えます。溶かすときはひとくちで飲める量にします。



上あごに



スポイトで



スプーンで

1 回分のミルクにまぜると、全部飲まなかったりミルクがらいいなったりしますので、少量のミルクに溶かしてぐすりを与え、それからおいしいミルクを与えます。



少量のミルクで溶かして おいしいミルクをたっぷり

幼児

水ぐすりも粉ぐすりもなるべく他のものに溶かさず、そのまま与える習慣をつけましょう。あとが薬になりますよ。ぐすりを嫌がる時には、本人が納得すれば何に混ぜてもかまいません。

☆牛乳、ヨーグルト、アイスクリームなどの乳製品に混ぜると苦味がやわらぎます。

☆スポーツドリンクやジュースに混ぜると、かえって苦味が強くなることがあります。

☆粉ぐすりを水に溶かし凍らせて与えてもよいでしょう。

☆冷たいもの、甘いものが、薬の味がごまかせます。



ぐすりのシャーベット



<いつ飲ませるのか？>

1 日 3 回の飲み薬であれば、約 8 時間ごとに(例えば、朝 8 時、昼 2 時、夜 8 時)に服用して下さい。基本的には食事と関係なく服用して差し支えありません。飲み忘れるといけけないので、朝・昼・夕食時に服用してもかまいません。1 日 3 回の飲み薬を保育所等で服用させてもらえない場合には、朝出掛ける前、保育所から帰ってすぐ、就寝前に服用して下さい。

1 日 2 回の飲み薬であれば、約 12 時間ごとに(例えば、朝 8 時、夜 8 時)に服用して下さい。飲み忘れるといけけないので、朝食時、就寝前に服用してもかまいません。



<食前それとも食後？>

授乳直前や食前に飲ませるようにして下さい。食後は満腹で飲まなかったり、食べたものといっしょに吐いてしまうことがあります。